



Grandes
Cultures

Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 18 du 09/10/96



COLZA

Grosses altises : Risques faibles.

Tenthredes-Limaces : Vigilance.

Charançon du bourgeon terminal :

1ères Captures - Surveiller vos cuvettes.

Insecticides Colza 1996 : A consulter.

CEREALES

Mosaïques : Choisir une variété tolérante si nécessaire.

REGLEMENTATION

L'Agrément pour la distribution et l'application des produits phytosanitaires.

COLZA

Stades : 2 à 6 feuilles (B2 à B6)

GROSSES ALTISES

⇒ Quelques captures en cuvettes depuis début Octobre.

⇒ Morsures : très faibles.

Aucune intervention ne se justifie.
⇒ **Rappel des seuils**
Cumul de 20 à 30 captures en cuvette.

LIMACES ET TENTHREDES

⇒ A surveiller de près.

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

⇒ Le vol débute timidement : 1ère capture le 8/10 seulement à MEZEL (63).

La lutte contre le Charançon du bourgeon terminal est impérative en Auvergne.

Surveiller attentivement vos cuvettes jaunes afin de bien positionner votre intervention (10 à 15 jours après les premières captures).

On s'achemine vers une intervention entre le 20 et le 28/10.

Consulter la fiche « Insecticides Colza 1996 » pour choisir l'insecticide adapté.

CEREALES

MOSAÏQUES

⇒ Les mosaïques sont des maladies à virus transmises par un champignon du sol (*Polymyxa graminis*) présent dans les sols contaminés. Le transport de terre permet une propagation du champignon et du virus (travaux du sol).



40 Jo
49845

D3

8nF
S&T

722

CEREALES (suite)

⇒ Sur blé : 2 mosaïques

- **VMB** : virus de la mosaïque du blé.
- **VMJB** : virus de la mosaïque jaune du blé.

Les sols peuvent présenter VMB seul, VMJB seul ou les 2 à la fois.

Triticale et seigle peuvent aussi être affectés par VMB.

Ces virus s'observent le plus souvent dans les sols à tendance argileuse, hydromorphe, à pH acide ou neutre.

⇒ En AUVERGNE, les mosaïques du blé sont présentes, mais l'intensité des attaques est encore globalement faible avec localement une pression moyennement forte. C'est dans l'Allier (Sologne - Bocage - Val d'Allier) que ces 2 maladies à virus se rencontrent le plus régulièrement. En 1996, des symptômes ont encore été visibles. La maladie a aussi été détectée sur TREMIE.

⇒ Sur orge : 2 mosaïques

- **VMJO** : virus de la mosaïque jaune de l'orge.
- **VMMO** : virus de la mosaïque modérée de l'orge.

Les deux virus sont souvent associés et peuvent entraîner des pertes de 10 à 50 %. Les virus de l'orge n'attaquent pas le blé et inversement. Ils se manifestent dans les sols calcaires peu profonds, engorgés d'eau l'hiver et ayant une rotation intensive en orge.

⇒ En AUVERGNE, les mosaïques de l'orge affectent les cultures situées dans l'Allier, mais à un niveau encore peu grave, particulièrement dans les secteurs de St-Pourçain/Besbre et de Rongères.

Il n'y a pas de méthode de lutte contre les mosaïques et le champignon vecteur.

Une seule solution : le recours à l'implantation de variétés tolérantes dans les parcelles à risque lorsque le niveau d'attaque devient préjudiciable.

BLE - VARIETES TOLERANTES AUX DEUX VIRUS (VMB et VMJB)

AMI	ENESCO	RUBENS
ARPAIN	ETCHO	SOMME
ATALANTE	GASCOGNE	SPONSOR
BASTILLE	GASPARD	SUPRA
CADENZA	GENESIX	TREMIE*
CATAMARAN	HINOPRIMA	VICTO
CHAMPDOR	RENFORT	

* Symptômes en 95 et 96 en AUVERGNE.

ORGE - VARIETES TOLERANTES AUX DEUX VIRUS (VMJ et VMMO)

2 RANGS :

AMILIS	GLEAM	SURISE
DRUID	LABEA	VANOISE
ECLAIR	REJANE	

6 RANGS :

ALASKA	ESTEREL	NIKEL
BALAKI	EXPRESS	OREGON
BALKAN	FEDERAL	ORNELLA
BENGAL	JAMAIQUE	REBELLE
CARAIBE	MAEVA	REFLEX
CAROUSEL	MAJESTIC	TAMARIS
CORTINA	MARILOR	VENUS
ENERGY	MOBSY	

REGLEMENTATION

L'AGREMENT DES ORGANISMES POUR LA DISTRIBUTION ET L'APPLICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES EST OBLIGATOIRE A COMPTER DU 01/01/1996.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 92-533 du 17 Juin 1992, nous rappelons que tout organismes :

- qui distribue des produits phytosanitaires visés par la loi du 2 Novembre 1943 classés « toxique, très toxique », cancérigène, mutagène, tératogène et dangereux pour l'environnement » (se référer à la note page 3) et/ou

- qui applique des produits phytosanitaires visés par la loi du 2 Novembre 1943 en prestation de service,

doit détenir un agrément délivré par le Ministre chargé de l'agriculture.

Les conditions d'obtention de cet agrément sont les suivantes :

- Justifier de l'emploi permanent des personnes certifiées par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, pour l'encadrement et la formation des employés.

- Justifier d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

Les conditions d'obtention du certificat doivent être demandées à la Direction Régionale de l'Agriculture et de la forêt - Service Formation et Développement.

REGLEMENTATION (SUITE)

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la loi et les personnes devant obtenir le certificat doivent impérativement retourner leur dossier dûment rempli avant le **31 Décembre 1996**. Au delà de ce délai, elles seront passibles des pénalités prévues par la loi.

Dans la loi du 2 Novembre 1943, sont visés les produits destinés à :

- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles tels qu'insectes, champignons, bactéries, virus, nématodes, vertébrés,
- détruire les végétaux indésirables comme les mauvaises herbes, broussailles,
- exercer une action sur les processus de croissance,
- améliorer en tant qu'adjuvant les conditions d'utilisation des produits ci-dessus,
- lutter contre les organismes vecteurs de maladies humaines notamment contre les gîtes larvaires de moustiques.

Sont également visés les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

- pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques,
- pour la préparation et le transport de la nourriture des animaux domestiques,
- pour la récolte, le transport, le stockage et la transformation industrielle des produits d'origine animale ou végétale,
- pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.

Ne sont pas visés :

- les produits destinés à l'industrie des bois après scierie tels que les charpentes, meubles et planches,
- les produits utilisés pour l'assainissement et le traitement antiparasitaire des logements de particuliers, à l'exception des rodenticides.

Insecticides Colza 1996

Les seuils d'intervention

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage en "cuvette jaune"
Limace	Dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 plantes sur 10 avec piqures nutritionnelles jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Larves de grosse altise	2 plantes sur 3 avec présence de larves	
Pucerons (verts et cendrés) à l'automne	1 plante sur 5 colonisée	
Charançon du bourgeon terminal		Intervenir 10 à 15 jours après les premières captures
Gros charançon de la tige		du stade C1 à Tige de 20 cm, intervenir 8 à 10 jours après les premières captures
Meligèthe	- au stade D1- D2 : 1 insecte par inflorescence - au stade E : 2 à 3 insectes par inflorescence	
Charançon des siliques	à partir du stade G2-G3 : 1 charançon pour 2 plantes	
Pucerons cendrés au printemps	du stade C1 à 3-4 semaines avant récolte : 2 colonies par m²	

Insecticides utilisables en traitements en végétation (1)

Matières actives	Spécialités commerciales	De la levée à la fin du repos hivernal			A partir de la reprise de la végétation			
		Grosse Altise	Charançon du bourgeon terminal	Pucerons	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Pucerons
alphaméthrine	Fastac Fastac 10	0,15 l 0,1 l	0,15 l		0,15 l	0,15 l 0,1 l	0,2 l 0,1 l	
betacyfluthrine	Ducat	0,3 l	0,3 l	0,3 l	0,3 l	0,2 l	0,2 l	
betacyfluthrine + oxydéméton-méthyl	Enduro			0,5 l				
bifenthrine	Talstar Talstar Flo	0,075 l 0,1 l	0,075 l 0,1 l		0,075 l 0,1 l	0,1 l 0,125 l	0,1 l 0,125 l	
cyfluthrine	Baythroid Blocus	0,3 l 0,3 l	0,3 l 0,3 l	0,3 l	0,3 l 0,3 l	0,2 l 0,2 l	0,2 l 0,2 l	
cyperméthrine	Nombreuses spécialités (2)	25 g m.a.			25 g m.a.	25 g m.a.	20 g m.a.	
deltaméthrine	Nombreuses spécialités (2)	5 g m.a.	5 g m.a.	6,25 g m.a.	5 g m.a.	5 g m.a.	5 g m.a.	
deltaméthrine + endosulfan	Galion	0,8 l	0,8 l					
deltaméthrine + pyrimicarbe	Best			1,25 l				1,25 l
dialiphos	Torak E					1,25 l	1,25 l	
endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	262 g m.a.			437 g m.a.	262 g m.a.	612 g m.a.	
endosulfan + parathion éthyl	Difène AP	0,75 l			1,25 l	0,75 l		
endosulfan + thiometon	Serk EC			1,5 l				1,5 l
esfenvalérate	Sumi alfa	0,6 l				0,5 l	0,6 l	
esfenvalérate + oxydéméton-méthyl	Sumiton			0,5 l				
fenvalérate	Sumicidin 10	0,5 l				0,4 l	0,4 l	0,1 l
lambda-cyhalothrine	Karaté vert	0,1 l	0,15 l	0,15 l	0,15 l	0,1 l		
lambda-cyhalothrine + pyrimicarbe	Karaté K. Open			1,25 l				1 l
malathion	Nombreuses spécialités (2)	700 g m.a.				700 g m.a.		
méthidathion	Nombreuses spécialités (2)	250 g m.a.			300 g m.a.	250 g m.a.		
parathion éthyl + méthyl	Nombreuses spécialités (2)	200 g m.a.			300 g m.a.	200 g m.a.		
phosalone	Nombreuses spécialités (2)			600 g m.a.		1000 g m.a.	1200 g m.a.	600 g m.a.
phosalone + parathion méthyl	Taxylone	0,75 l				0,75 l		
pyrimicarbe	Pirimor G - Aphox			0,5 kg				0,5 kg
taufluvinate	Mavrik Flo	0,2 l		0,2 l		0,2 l		0,2 l
taufluvinate + thiometon	Mavrik B, Mavrik systo			0,4 l				0,4 l
tralométhrine	Tracker 108 EC	0,065 l	0,065 l		0,09 l	0,065 l	0,065 l	
triazamate	Aztec			0,5 l				0,5 l

(1) Doses exprimées en litre ou kilogramme de produit commercial par hectare

(2) Doses exprimées en gramme de matière active par hectare

Liste arrêtée au 1er janvier 1996



Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des Végétaux
Bureau réglementation des produits antiparasitaires
et des matières fertilisantes

Note

relative aux produits visés à l'article 1er de la loi du 17 juin 1992
concernant la distribution des produits classés dans les catégories
toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène
et dangereuse pour l'environnement

TOXIQUE

accompagné du
symbole **T**



Produit qui, par inhalation, pénétration ou ingestion cutanée, peut entraîner des risques graves après une seule exposition ou après exposition prolongée

- par inhalation :
R 23 Toxique par inhalation
- par voie cutanée :
R 24 Toxique par contact avec la peau
- par voie orale :
R 25 Toxique en cas d'ingestion
- effets irréversibles :
R 39 Danger d'effets irréversibles
- effets graves en cas d'exposition prolongée :
R 48/23 Toxique : Risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation
R 48/24 Toxique : Risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau
R 48/25 Toxique : Risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion

TRES TOXIQUE

accompagné du
symbole **T +**



Produit qui, par inhalation, pénétration ou ingestion cutanée, peut entraîner des risques extrêmement graves, aigus et même la mort.

- par inhalation :
R 26 Très toxique par inhalation
- par voie cutanée :
R 27 Très toxique par contact avec la peau
- par voie orale :
R 28 Très toxique en cas d'ingestion
- effets irréversibles :
R 39 Danger d'effets irréversibles

CANCERIGENE

- produit pouvant provoquer le cancer :

R 45 Peut causer le cancer

R 49 Peut causer le cancer par inhalation

accompagné du
symbole T



- produit susceptible d'effets cancérogènes possibles :

R 40 Possibilité d'effets irréversibles

accompagné du
symbole Xn




MUTAGENE

- produit pouvant causer des altérations génétiques :

R 46 Peut causer des altérations génétiques héréditaires

accompagné du
symbole T



- produit susceptible d'effets cancérogènes possibles :

R 40 Possibilité d'effets irréversibles

accompagné du
symbole Xn



TERATOGENE - TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION

- produit toxique pour la reproduction pouvant altérer la fertilité ou causer des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine :

R 60 Peut altérer la fertilité

R 61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

accompagné du
symbole T




- produit susceptible d'effets possibles sur la reproduction pouvant altérer la fertilité ou causer des effets sur le développement :

R 62 Risque possible d'altération de la fertilité

R 63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

accompagné du
symbole Xn



DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

- le symbole N, dangereux pour l'environnement, et les phrases de risque y afférant ne s'appliquent pas actuellement aux préparations, c'est à dire aux produits formulés. Les textes réglementaires sont en cours d'élaboration au niveau de l'Union européenne.